Tél : 22 42 14 33
Fax : 22 42 14 65
Email : info@agritecgroup.com
Site Web : www.agritecgroup.com

ACM-AMINO 12

(Engrais azoté pour les cultures pérennes et le maraicher)

COMPOSITION

Il est composé de 55% de Matière organique, de 20% Acides aminés totales 100% d'origine végétale, de 12% d'Acides aminés libres (L) 100% d'origine végétale et de 8% Azote.

USAGE: cet engrais est utilisé pour améliorer l'alimentation minérale et hydrique de la plante afin de stimuler leur croissance végétative et leur productivité.

FORMULATION

ACM-AMINO 12 est sous la forme liquide. Il est conditionné en bidon de 5 litres.

MODE D'ACTION

ACM-AMINO 12 est un produit avec un contenu élevé d'acides aminés libres, dans une forme lev gire (des L- acides aminés).

Spécialement créée comme engrais foliaire et radiculaire, C'est un hydrolysé de protéines dans la présentation liquide, qui apporte à la plante les acides aminés nécessaires pour un grand développement végétatif et principalement dans de difficiles époques ou dans des conditions climatiques défavorables.

Grace à son contenu en acides aminés et des peptides, il aide également les cultures à surpasser des conditions défavorables comme une attaque de parasites, de sécheresse, de stress oxydatif. Il permet à la plante de profiter mieux de bonnes conditions naturelles.

MODE D'EMPLOI

ACM-AMINO 12 est appliqué par pulvérisation du feuillage, la quantité totale recommandée par hectare pour la culture doit être respectée.

DOSE D'APPLICATION

Il est recommandé d'utiliser les quantités suivantes au moment de l'application :

Cultures	**Moment d'application**	**L/ha**
Arbre fruitier	En poussée végétative, 1 à 2 applications, ainsi que durant le développement du fruit	2-3
Bulbes et tubercules	Après 10 ou 15 jours de la transplantation, ou levée de la culture, répéter ensuite après 30, 45 et 60 jours	4-5
Tomate, piment, concombre, haricot, pois	Applications depuis le début du développement végétatif jusqu'à la fin de la culture, chaque 7-10 jours	3-4
Melon-pastèque	Applications 2 à 3 fois, durant le développement végétatif en préfloraison, pour stimuler la floraison et au cours du développement du fruit.	3-5

PRECAUTION A PRENDRE POUR LES MANIPULATIONS

- Porter les vêtements et équipements de sécurités.
- Eviter le contact avec les yeux et la peau ;
- Se laver les mains à l'eau propre, au savon et changer les vêtements contaminés après traitement ;
- Ne pas jeter les résidus dans des égouts et le produit ainsi que son récipient doivent être détruits en prenant toutes les précautions d'usage.